


Що таке обліпіха? Номенклатура і поширення

Родина *Elaeagnaceae* Juss – маслинкові складається з трьох родів – *Elaeagnus* L. – маслинка, *Shepherdia* Nutt. – шефердія і *Hipporhae* L. – **щець**. В останньому роді нараховують 7 видів і 9 підвидів. Євразійський вид *Hipporhae rhamnoides* L.– щець жостероподібний має широкий диз'юнктивний (розірваний) ареал від атлантичних районів Європи до майже тихоокеанського узбережжя Азії. Вид поділяють на декілька підвидів, в тому числі щець карпатський (subsp. *carpatica* Rousi), ареал якого заходить на територію України в гирлі Дунаю.

Наукову назву роду *Hipporhae* (читається як Гіппофае) утворено сполученням грецьких слів, що означають "кінь" і "виблискувати, сяти", тобто "лискучий кінь", що вказує на використання гілок і листків обліпіхи як корму, внаслідок чого шкіра коней починала блищати, вказуючи на їхній здоровий вигляд і стан.

Національну ботанічну номенклатуру варто будувати, надаючи родам рослин національних назв. Такою для цієї аборигенної рослини природної флори України є українська назва "щець". Видовий епітет "*rhamnoides*" потрібно перекладати як "жостероподібний", а не "крушиноподібний", бо *Rhamnus* – це жостір, а не крушина (*Frangula*).

У плодівництві щець відомий під назвою **обліпіха**. Ця плодова культура прийшла з Росії під російською назвою рослини, яка вдало підкреслює морфологічні особливості плодоносних гілок, що рясно вкриті плодами. Вона міцно увійшла в ужиток і стала рівноправною складовою української садівничої термінології.



Природний ареал *Hipporhae rhamnoides* та її підвидів